

## 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II

### 3. välikoe 28.2.2019

#### VÄLIVAIHEET JA PERUSTELUT NÄKYVIIN, KIITOS!

1. a) Olkoon  $V$  suljettu kappale, jota ylhäältä rajoittaa pallopinta  $z = f(x, y) = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$  ja alhaalta taso  $z = g(x, y) = 0$  sekä sivulta lieriöpinta  $x^2 + y^2 = 2^2$ . Kuvaan kappale  $V$  sylinterikoordinaattien  $r, \varphi$  ja  $z$  avulla sekä laske sylinterikoordinaattien avulla integraali

$$\iiint_V 3z^3 dV. \quad (4p)$$

- b) Laske sen kappaleen tilavuus, jota ylhäältä rajoittaa pinta  $z = f(x, y) = 2xy^3 + 1$ , alhaalta pinta  $z = g(x, y) = -2xy^3 - 1$  sekä sivulta pinnat  $y = x^2$ ,  $y = x^2 + 1$  ja tasot  $x = 0$ ,  $x = 1$ . (4p)
2. a) Olkoon  $\vec{F}(x, y, z) = (12x^2y^2 + 5z)\vec{i} + (8x^3y - 3z^2)\vec{j} + (5x - 6yz - 7)\vec{k}$  vektorikenttä ja  $C$  käyrä  $\vec{x}(t) = (3t^3 - 1)\vec{i} + (t^2 - 1)e^{t^3+t}\vec{j} + t \cos(\pi t)\vec{k}$ ,  $0 \leq t \leq 1$ . Laske vektorikentän  $\vec{F}$  divergenssi  $\nabla \cdot \vec{F}$  ja roottori  $\nabla \times \vec{F}$ . Onko vektorikentällä  $\vec{F}(x, y, z)$  potentiaalfunktio  $U(x, y, z)$ ? Perustelu. Jos potentiaalfunktio  $U(x, y, z)$  on olemassa, niin kirjoita laskukaava käyräintegraalin

$$\int_C (12x^2y^2 + 5z) dx + (8x^3y - 3z^2) dy + (5x - 6yz - 7) dz = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

laskemiseksi tämän potentiaalfunktion avulla. Mahdollista potentiaalfunktioita  $U(x, y, z)$  ei tarvitse määritää. (4p)

- b) Olkoon  $S$  se osa paraboloidipintaa  $z = f(x, y) = 5 - x^2 - y^2$ , joka on ympyrärenkaan osan

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2^2, x \leq 0, y \geq 0\}$$

yläpuolella ja jonka ulkoinen yksikkönormaalivektori on

$$\vec{n}^0 = \frac{(2x, 2y, 1)}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}.$$

Laske napakoordinaattien avulla vektorikentän  $\vec{F}(x, y, z) = 4yz\vec{i} - 4xz\vec{j} + (5y - yz)\vec{k}$  vuo pinnan  $S$  läpi. (4p)

KAAVAKOKOELMA LIITTEENÄ

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad |x| < 1$$

$$\overline{\arctan} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots, \quad |x| < 1$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt$$

$$D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - [f_{xy}(x,y)]^2$$

$$\begin{cases} x = \rho \sin \theta \cos \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} \quad \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\theta,\varphi)} \right| = \rho^2 \sin \theta \quad \oint_{\partial A} P dx + Q dy = \iint_A \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

$$\iint_S F(x,y,z) dS = \iint_A F(x,y,f(x,y)) \sqrt{1 + [f_x(x,y)]^2 + [f_y(x,y)]^2} dA$$

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{x} = \iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS \quad \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

$$D\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2} \quad D(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad Dx^n = nx^{n-1}$$

$$D([f(x)]^n) = n[f(x)]^{n-1}f'(x) \quad De^{f(x)} = e^{f(x)}f'(x) \quad D \ln |f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$D \overline{\arctan} x = \frac{1}{1+x^2} \quad D \sin x = \cos x \quad D \cos x = -\sin x$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int f'(x)[f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

$$\int f'(x)e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \overline{\arctan} x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$